



ÜRETİCİLERİMİZE DUYURULUR

Üzümde Bağ Küllemesi Hastalığı Mücadelesi Zamanı



Üzümde % 100 kadar verim kaybına neden olan Bağ Küllemesi hastalığı için, rakımı 750-1100 metre olan yerlerde, 30 Hazirana kadar, üçüncü ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Hava nispi neminin %70 ler düzeyinde seyrettiğinden, hastalığın bu yıl yaygın olması beklenmektedir. Bu nedenle ilaçlama 15 gün sonra tekrarlanmalıdır.

Külleme hastalığı için yapılan ilaçlamada, ilaçların yaprakların alt yüzünü ve salkımları ıslatması mutlaka gereklidir. Yüzeysel ve üstten ilaçlamalar etkisiz kalmaktadır. İlaçlama güneşsiz saatlerde ve zehirlenmelere karşı mutlaka tedbir alınarak yapılmalıdır.

İl ve İlçe Müdürlüklerimiz veya reçete yazma yetkilisi Ziraat Mühendislerinden yardım alınarak, ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapılması gerekmektedir. İlaçlamaya başlamadan önce lütfen tedbir alınız.

